

GEOMETRIJA 2

zadaci po kojima se drže vežbe

PODUDARNOST

1. Ako su B_1 i C_1 središta duži CA i BA trougla ABC , onda su prave BC i B_1C_1 paralelne i važi $B_1C_1 = \frac{1}{2}BC$. (**srednja linija trougla**)
2. Ako su A, B, C, D četiri različite tačke i M, N, K, L, P, Q središta duži AB, BC, CD, DA, AC, DB redom, dokazati:
 - 1) MN i KL , MP i QK , NP i QL su međusobno podudarne duži;
 - 2) duži LN, MK, PQ imaju zajedničko središte;
 - 3) svaki od uglova $\angle PMQ, \angle PNQ, \angle LMN$ podudaran je jednom od uglova kojeg određuju prave AC i BD , BC i AD , AB i CD .
3. Dokazati da se težišne duži trougla sekaju u tački koja ih deli u odnosu $2 : 1$. (**težište trougla**)
4. Neka je D podnožje visine iz temena C pravouglog trougla ABC na hipotenuzu AB , a O_1 i O_2 centri krugova upisanih u trouglove CAD i CBD . Dokazati da je simetrala pravog ugla trougla ABC normalna na pravoj O_1O_2 .
5. Dokazati da tačke simetrične ortocentru u odnosu na:
 - a) stranice trougla;
 - b) središta stranica trougla;pripadaju krugu opisanom oko tog trougla.
6. Središte opisanog kruga O , ortocentar H i težište T proizvoljnog trougla su kolinearne tačke i važi $HT = 2TO$. Dokazati. (**Ojlerova prava**)
7. Središta stranica, podnožja visina i središta duži određenih temenima i ortocentrom trougla pripadaju jednom krugu. Dokazati. (**Ojlerov krug**)
8. Podnožja normala iz proizvoljne tačke kruga opisanog oko nekog trougla, na pravama koje sadrže stranice tog trougla, pripadaju jednoj pravoj. (**Simsonova prava**)
9. Dat je tetivan četvorougao $ABCD$ čije su dijagonale međusobno normalne i sekaju se u tački S .
 - a) Prava koja sadrži tačku S i normalna je na pravoj AB sadrži središte duži CD . Dokazati.
 - b) Ako su A', B', C', D' projekcije tačke S na pravama AB, BC, CD, DA , redom, tada je četvorougao $A'B'C'D'$ tetivan i tangentan. Dokazati.
10. Nad ivicama trougla ABC u spoljašnjosti konstruisani su jednakoststranični trouglovi ADB, BEC, CFA . Dokazati da su duži AE, BF, CD međusobno podudarne i da se sekaju u jednoj tački. (**Toričelijeva tačka**)
11. Medijatrisa stranice i bisektrisa naspramnog ugla trougla sekaju se u tački koja pripada opisanom krugu tog trougla. Dokazati.
12. Neka su P i Q središta lukova \widehat{AB} i \widehat{AC} kruga opisanog oko trougla ABC i s_α bisektrisa ugla $\angle BAC$. Dokazati da je $PQ \perp s_\alpha$.

- 13.** Neka su A' , N i O redom podnožje visine iz A , presek bisektrise ugla $\angle BAC$ sa opisanom krugom trougla ABC ($AB < AC$) i centar opisanog kruga, dokazati $\angle A'AN = \angle ANO = \angle NAO = \frac{1}{2}(\angle ABC - \angle ACB)$.
- 14. (Veliki zadatak)** Ako sa A_1 , B_1 i C_1 obeležimo središta ivica $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$ trougla ABC ($b > c$), sa p poluobim tog trougla, sa $l(O, r)$ opisani krug tog trougla, sa P, Q, R tačke u kojima upisani krug $k(S, \rho)$ dodiruje prave BC, CA, AB , sa P_i, Q_i, R_i ($i = a, b, c$) tačke u kojima spolja upisani krug $k_i(S_i, \rho_i)$ dodiruje redom prave BC, CA, AB , sa M i N tačke u kojima medijatrisa ivice BC seče krug l , pri čemu je M na luku BAC , sa M' i N' podnožja upravnih iz tačaka M i N na pravoj AB , dokazati da je:
- 1) $\mathcal{B}(A, P', P_a)$, $\mathcal{B}(A, P, P'_a)$, $\mathcal{B}(P_c, A, P'_b)$, $\mathcal{B}(P_b, A, P'_c)$;
 - 2) $AQ_a = AR_a = p$, $QQ_a = RR_a = a$, $Q_bQ_c = R_bR_c = a$;
 - 3) $AQ = AR = BR_c = BP_c = CP_b = CQ_b = p - a$;
 - 4) $PP_a = b - c$, $P_bP_c = b + c$;
 - 5) $PA_1 = P_aA_1$, $P_cA_1 = P_bA_1$;
 - 6) $A_1M = \frac{1}{2}(\rho_b + \rho_c)$, $A_1N = \frac{1}{2}(\rho_a - \rho)$;
 - 7) $MM' = \frac{1}{2}(\rho_b - \rho_c)$, $NN' = \frac{1}{2}(\rho + \rho_a)$;
 - 8) $AM' = \frac{1}{2}(b - c) = BN'$, $AN' = \frac{1}{2}(b + c) = BM'$;
 - 9) $M'N' = b'$;
 - 10) $\rho_a + \rho_b + \rho_c = 4r + \rho$;
 - 11) $NS = NS_a = NB = NC$, $MS_b = MS_c = MB = MC$.

SLIČNOST

- 1.** Ako su E i F tačke u kojima bisektrise unutrašnjeg i spoljašnjeg ugla $\triangle BAC$ trougla ABC ($AB < AC$) sekutu pravu BC dokazati $BE : CE = BF : CF = AB : AC$.
- 2.** Neka su E i F tačke iz prethodnog zadatka. Dokazati:
- 1) $AS : SE = AS_a : S_aE = (AB + AC) : BC$;
 - 2) $AE : SE = (AB + BC + CA) : BC$, $AE : S_aE = (AB + AC - BC) : BC$;
 - 3) $AS_b : S_bF = AS_c : S_cF = (AC - AB) : BC$.
- 3.** Dokazati (važe oznake iz Velikog zadatka):
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1) $SA \cdot SN = 2r\rho$; | 3) $S_bA \cdot S_bM = 2r\rho_b$; |
| 2) $S_aA \cdot S_aN = 2r\rho_a$; | 4) $S_cA \cdot S_cM = 2r\rho_c$. |
- 4. (Ptolomejeva teorema)** Ako je $ABCD$ konveksan i tetivan četvorougao, dokazati da važi $AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot AD$.
- 5.** Ako su a i d ivica i dijagonala pravilnog petougla, izraziti d u funkciji od a . Kako se konstruiše pravilni petougao ivice a ?
- (Čevaova teorema)** Ako su P, Q, R redom tačke pravih BC, CA, AB gde su A, B, C tri nekolinearne tačke, tada prave AP, BQ, CR pripadaju jednom pramenu ako i samo ako važi $\frac{\overrightarrow{BP}}{\overrightarrow{PC}} \frac{\overrightarrow{CQ}}{\overrightarrow{QA}} \frac{\overrightarrow{AR}}{\overrightarrow{RB}} = 1$.
- (Menelajeva teorema)** Tačke P, Q, R pravih određenih stranicama BC, CA, AB trougla ABC su kolinearne ako i samo ako važi $\frac{\overrightarrow{BP}}{\overrightarrow{PC}} \frac{\overrightarrow{CQ}}{\overrightarrow{QA}} \frac{\overrightarrow{AR}}{\overrightarrow{RB}} = -1$.

6. Ako su P, Q, R tačke u kojima upisani krug trougla ABC dodiruje stranice BC, CA, AB , dokazati da su prave AP, BQ, CR konkurentne.
7. Dokazati da se bisektrisa jednog unutrašnjeg i dva spoljašnja ugla trougla ABC sekut u jednoj tački.
8. Dokazati da, ukoliko postoje tačke u kojima bisektrise spoljašnjih uglova kod temena A, B i C sekut prave određene naspramnim stranicama trougla ABC , one su kolinearne.
9. Dokazati da tačke P, Q, R u kojima tangente opisanog kruga trougla ABC u njegovim temenima sekut prave određene naspramnim stranicama, ukoliko postoje, pripadaju jednoj pravoj.

Def. Neka su P, Q, R, S četiri razne kolinearne tačke. Par tačaka (P, Q) je harmonijski spregnut sa parom (R, S) ako važi $\frac{\overrightarrow{PR}}{\overrightarrow{RQ}} = -\frac{\overrightarrow{PS}}{\overrightarrow{SQ}}$. Tada pišemo $\mathcal{H}(P, Q; R, S)$.

Def. Prave a, b, c, d jednog pramena su harmonijski spregnute ako postoji prava p koja ih seče u harmonijski spregnutim tačkama. Tada pišemo $\mathcal{H}(a, b; c, d)$. Ova osobina ne zavisi od izbora prave p .

Osobine:

- Ako važi $\mathcal{H}(P, Q; R, S)$ tada važi i $\mathcal{H}(Q, P; R, S), \mathcal{H}(Q, P; S, R), \mathcal{H}(R, S; P, Q)$.
- Ako su P, Q, R tri kolinearne tačke i R nije središte duži PQ , tada postoji jedinstvena tačka S takva da je $\mathcal{H}(P, Q; R, S)$.
- $\mathcal{H}(P, Q; R, S) \Rightarrow \mathcal{B}(P, R, Q) \vee \mathcal{B}(P, S, Q)$.
- Ako su a, b, c, d konkurentne prave i $c \perp d$ važi: $\mathcal{H}(a, b; c, d) \Leftrightarrow c$ i d su simetrale uglova određenih pravama a i b .

10. Važi $\mathcal{H}(P, Q; R, S)$ ako i samo ako postoje četiri tačke A, B, C, D takve da važi $AB \cap CD = \{P\}, BC \cap AD = \{Q\}, PQ \cap AC = \{R\}, PQ \cap BD = \{S\}$.
11. Ako su A, B, C, D razne kolinearne tačke, a O središte duži AB , tada važi $\mathcal{H}(A, B; C, D) \Leftrightarrow AO^2 = OC \cdot OD$.
12. Ako su A, B, C, D razne tačke prave p , O tačka van te prave, E i F tačke u kojima prava koja sadrži tačku B i paralelna je OA seče OC i OD , dokazati da važi $\mathcal{H}(A, B; C, D) \Leftrightarrow B$ je središte EF .
13. Neka su $\overline{S}, \overline{S_a}, \overline{S_b}, \overline{S_c}$ projekcije tačaka S, S_a, S_b, S_c na pravu odredjenu visinom AA' trougla ABC , a \overline{E} projekcija tačke E na pravu AC . Dokazati:
 - 1) $\mathcal{H}(A, E; S, S_a), \mathcal{H}(A, A'; \overline{S}, \overline{S_a}), \mathcal{H}(A, \overline{E}; Q, Q_a), \mathcal{H}(A', E; P, P_a);$
 - 2) $\mathcal{H}(A, F; S_b, S_c), \mathcal{H}(A', F; P_b, P_c), \mathcal{H}(A, A'; \overline{S_b}, \overline{S_c})$.
14. (**Apolonijev krug**) Odrediti skup svih tačaka u ravni kojima su rastojanja od dveju datih tačaka srazmerna datim nepodudarnim dužima.

Def. Ako neka prava koja sadrži tačku P seče krug $k(O, r)$ u tačkama A i B , tada je *potencija* tačke P u odnosu na krug k data sa $p(P, k) = \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = PO^2 - r^2$ i ne zavisi od izbora prave. Potencija tačke P je veća, manja ili jednaka nuli u zavisnosti da li se tačka nalazi u spoljašnjosti ili unutrašnjosti kruga ili na krugu.

Def. Geometrijsko mesto tačaka ravni koje imaju jednake potencije u odnosu na dva data kruga $k_1(O_1, r_1)$ i $k_2(O_2, r_2)$ je prava koja se zove *radikalna* ili *potencijalna osa*.

Radikalna osa je upravna na pravoj O_1O_2 . Radikalne ose triju krugova neke ravni pripadaju jednom pramenu.

- 15.** Neka su A, B, C, D kolinearne tačke takve da važi $\mathcal{B}(A, C, B, D)$ i neka je k krug nad prečnikom AB i l bilo koji krug koji sadrži tačke C, D . Dokazati da važi $\mathcal{H}(A, B; C, D) \Leftrightarrow k \perp l$.
- 16.** Ako je $l(O, r)$ opisan krug, $k(S, \rho)$ upisani krug i $k_a(S_a, \rho_a)$ spolja upisani krug koji dodiruje stranicu BC datog trougla ABC , dokazati da je $OS^2 = r^2 - 2r\rho$ i $OS_a^2 = r^2 + 2r\rho_a$.
- 17.** Prava određena visinom AD trougla ABC predstavlja radikalnu osu krugova kojima su prečnici težišne linije BB' i CC' tog trougla.

KONSTRUKTIVNI ZADACI

- 1.** Konstruisati trougao ABC ako su zadati sledeći elementi:

- | | |
|---|---|
| 1) $t_a, t_b, t_c;$
2) $\beta, \gamma, p;$
3) $\alpha, a, b + c;$
4) $\beta, h_c, b \pm c;$
5) $t_a, h_b, b \pm c;$
6) $\beta - \gamma, b, c;$ | 7) $\beta - \gamma, l_a, \rho;$
8) $\alpha, b - c, \rho_a;$
9) $a, \rho_b, \rho_c;$
10) $\alpha, \rho, \rho_a;$
11) $b - c, h_a, \rho.$ |
|---|---|

- 2.** Date su tačke A_1, S, F . Konstruisati trougao ABC ako je A_1 središte BC , S centar upisanog kruga, a F presek simetrale spoljašnjeg ugla u temenu A i prave BC .
- 3.** Konstruisati tetivni četvorougao takav da su mu ivice podudarne datim dužima.

INVERZIJA

Def. Neka je $k(O, r)$ proizvoljni krug ravnih E^2 . *Inverzija u odnosu na krug k* je preslikavanje $\psi_k : E^2 \setminus \{O\} \rightarrow E^2 \setminus \{O\}$ kojom se tačka P slika u tačku P' takvu da P i P' pripadaju istoj polupravoj sa temenom u O i važi $OP \cdot OP' = r^2$.

Osobine

- $\psi_k^2 = Id$.
- $\psi_k(P) = P \Leftrightarrow P \in k$.
- ψ_k slika unutrašnjost kruga u spoljašnjost i obrnuto.
- Ako ψ_k slika A u A' i ako je PQ prečnik kruga k takav da su P, Q, A, A' kolinearne, onda važi $\mathcal{H}(P, Q; A, A')$.
- Ako prava p sadrži tačku O , tada se $p \setminus \{O\}$ slika u $p \setminus \{O\}$.
- Ako prava p ne sadrži tačku O , onda se slika u $l \setminus \{O\}$ gde je l krug koji sadrži O .
- Ako krug l sadrži tačku O , onda se $l \setminus \{O\}$ slika u pravu koja ne sadrži O .
- Ako krug l ne sadrži tačku O slika se u krug l_1 koji takođe ne sadrži O . Pri tom se centar kruga l NE PRESLIKAVA u centar kruga l_1 .
- $\psi_k(A)\psi_k(B) = \frac{r^2}{OA \cdot OB} AB$.
- ψ_k čuva uglove između krivih.

1. Ako se krugovi k_1 i k_2 dodiruju u centru inverzije, tada se inverzijom slikaju u dve paralelne prave. Dokazati.
2. Neka se inverzijom ψ_k tačka A koja ne pripada krugu k slika u A' i neka je l proizvoljan krug koji sadrži A i A' . Dokazati da je $l \perp k$.
3. Neka je O centar opisanog kruga l trougla ABC . Ako su B' i C' tačke polupravih AB i AC takve da je $AB \cdot A'B' = AC \cdot A'C'$ dokazati da je $OA \perp B'C'$.
4. Neka je $ABPQ$ netetivni četvorougao. Dokazati da je ugao između krugova opisanih oko trouglova ABP i ABQ jednak uglu između krugova opisanih oko trouglova PQA i PQB .
5. Neka se krugovi k_1, k_2, k_3 međusobno dodiruju u tačkama P, Q, R . Dokazati da je krug opisan oko trougla PQR ortogonalan na sva tri kruga.
6. Krugovi k_1, k_2, k_3 su međusobno ortogonalni, pri čemu se k_1 i k_2 sekut u tačkama A i B , k_2 i k_3 u tačkama C i D , k_3 i k_1 u tačkama E i F . Dokazati da se krugovi opisani oko trouglova ACE i ADF dodiruju u tački A .
7. U ravni su data četiri kruga od kojih svaki dodiruje tačno dva kruga od preostalih. Dokazati da su dodirne tačke kolinearne ili konciklične.
8. Konstruisati krug k koji sadrži dve date tačke A i B i dodiruje datu pravu p .
9. Konstruisati krug k koji sadrži datu tačku A i dodiruje date krugove k_1 i k_2 .
10. Konstruisati krug koji spolja dodiruje tri data kruga k_1, k_2, k_3 .

IZOMETRIJSKE TRANSFORMACIJE RAVNI

1. Dokazati: $\mathcal{S}_p \circ \mathcal{S}_q = \mathcal{S}_q \circ \mathcal{S}_p \Leftrightarrow p = q \vee p \perp q$.
2. Dokazati: $\mathcal{S}_p \circ \mathcal{S}_q \circ \mathcal{S}_r = \mathcal{S}_r \circ \mathcal{S}_q \circ \mathcal{S}_p$ ako i samo ako su p, q, r prave jednog pramena.
3. Dokazati: $\mathcal{S}_B \circ \mathcal{S}_p \circ \mathcal{S}_A = \mathcal{S}_A \circ \mathcal{S}_p \circ \mathcal{S}_B \Leftrightarrow AB \perp p$.
4. Neka je $ABCD$ romb takav da je $\angle BAD = 60^\circ$ i neka prava p seče redom stranice AB i BC u tačkama M i N tako da je zbir duži BM i BN jednak stranici romba. Dokazati da je trougao DMN pravilan.
5. Neka je $ABCDE$ petougao upisan u krug takav da je $BC \parallel DE$ i $CD \parallel EA$. Dokazati da D pripada medijatrisi stranice AB .
6. Neka je u ravni \mathbb{E}^2 dat trougao ABC i neka su B', C' tačke pravih AB i AC takve da važi $\mathcal{B}(A, B, B')$ i $\mathcal{B}(A, C, C')$. Ako je P_a tačka u kojoj spolja upisani krug koji odgovara temenu A dodiruje stranicu BC tog trougla, dokazati da je $\mathcal{R}_{C, \angle C'CB} \circ \mathcal{R}_{A, \angle BAC} \circ \mathcal{R}_{B, \angle CBB'} = \mathcal{S}_{P_a}$.
7. Neka je t tangenta opisanog kruga trougla ABC u temenu A . Dokazati da važi $\mathcal{G}_{\overrightarrow{CA}} \circ \mathcal{G}_{\overrightarrow{BC}} \circ \mathcal{G}_{\overrightarrow{AB}} = \mathcal{S}_t$, gde je \mathcal{G} klizajuća simetrija.
8. Dokazati da je četvorougao $ABCD$ tetivan ako i samo ako važi $\mathcal{G}_{\overrightarrow{DA}} \circ \mathcal{G}_{\overrightarrow{CD}} \circ \mathcal{G}_{\overrightarrow{BC}} \circ \mathcal{G}_{\overrightarrow{AB}} = \mathcal{E}$.
9. Data su dva kruga koji imaju presečnu tačku A . Konstruisati pravu koja sadrži A i na kojoj dati krugovi odsecaju podudarne duži.
10. Konstruisati trougao ABC takav da su date nekolinearne tačke O_a, O_b i O_c središta kvadrata konstruisanih spolja nad njegovim ivicama BC, CA i AB .

STEREOMETRIJA

1. a) Dokazati da u prostoru \mathbb{E}^3 postoji jedinstvena prava koja sadrži datu tačku O i upravna je na svakoj od dveju mimoilaznih pravih p i q .
b) Ako su P i Q podnožja zajedničke normale dveju mimoilaznih pravih p i q , dokazati da je duž PQ kraća od svih ostalih duži koje spajaju tačke pravih p i q .
2. Zbir dve stranice triedra veći je od treće. Dokazati.
3. Ravn od kojih je svaka određena ivicom i simetralom naspramne stranice triedra imaju zajedničku pravu. Dokazati.
4. Neka su strane triedra jednake redom $60^\circ, 45^\circ, 45^\circ$. Dokazati da je diedar naspram najveće stranice prav.
5. Dokazati da se oko svakog tetraedra $ABCD$ u prostoru \mathbb{E}^3 može opisati sfera, kao i da se u svaki tetraedar može upisati sfera.
6. a) Duži određene središta naspramnih ivica trostrane piramide (tetraedra) sekut se u jednoj tački koja ih polovi. Dokazati. (**Težište tetraedra**)
b) Dokazati da težište tetraedra deli duži određene temenima i težištima naspramnih strana u odnosu $3 : 1$.
7. a) Dve naspramne ivice nekog tetraedra su međusobno podudarne ako i samo ako su duži određene središta ostalih dvaju parova naspramnih ivica međusobno normalne.
b) Dve naspramne ivice tetraedra su normalne ako i samo ako su duži određene središta ostalih dvaju parova naspramnih ivica međusobno podudarne.
8. Dokazati da je prava određena središta stranica AC i BD tetraedra $ABCD$ ujedno i njihova zajednička normala ako i samo ako je $AB = CD$ i $AD = BC$.

Def. Tetraedar $ABCD$ je *ortogonalan* ako važi $AB \perp CD$, $AC \perp BD$, $AD \perp BC$.

9. Visine AA' i BB' tetraedra $ABCD$ se sekut ako i samo ako je $AB \perp CD$. Dokazati.
10. Dokazati da podnožja visina iz temena tetraedra predstavljaju ortocentre naspramnih pljosni ako i samo ako je tetraedar ortogonalan.

IZOMETRIJSKE TRANSFORMACIJE PROSTORA

1. Dokazati: $\mathcal{S}_\pi \circ \mathcal{S}_O = \mathcal{S}_O \circ \mathcal{S}_\pi \Leftrightarrow O \in \pi$.
2. Dokazati da je kompozicija neparnog broja centralnih simetrija prostora ponovo centralna simetrija.
3. Ako su A, B, C tri tačke ravni π , dokazati da važi $\mathcal{G}_{\pi, \overrightarrow{CA}} \circ \mathcal{G}_{\pi, \overrightarrow{BC}} \circ \mathcal{G}_{\pi, \overrightarrow{AB}} = \mathcal{S}_\pi$.
4. Odrediti tip izometrije $\mathcal{T}_{\overrightarrow{PP'}} \circ \mathcal{S}_\pi$.
5. Dokazati da je kompozicija tri ravanske refleksije kojima su osnove određene bočnim pljosnima trostrane prizme $ABC'A'B'C'$ klizajuća refleksija tog prostora.
6. Odrediti tip i komponente izometrije koja predstavlja kompoziciju dveju osnih refleksija $\mathcal{S}_p \circ \mathcal{S}_q$ euklid-skog prostora, u zavisnosti od uzajamnog položaja pravih p i q .

7. Neka su OP, OQ, OR tri međusobno normalne duži prostora. Dokazati da je kompozicija $\mathcal{Z}_{\overrightarrow{OR}} \circ \mathcal{Z}_{\overrightarrow{OQ}} \circ \mathcal{Z}_{\overrightarrow{OP}}$ translacija.
8. Dokazati da je u euklidskom prostoru kompozicija sastavljena od tri ravanske refleksije kojima su osnove određene pljosnjima triedra osnorotaciona refleksija.

HIPERBOLIČKA GEOMETRIJA

1. Prave određene osnovicom i protivosnovicom Sakerijevog četvorougla su hiperparalelne. Dokazati.
2. Uglovi na protivosnovici Sakerijevog četvorougla su podudarni i oštri. Dokazati.
3. Dokazati da su dva Lambertova četvorougla $ABCD$ i $A'B'C'D'$ sa oštrim uglovima D i D' podudarna ako je:
 - a) $AB = A'B', BC = B'C'$;
 - b) $AB = A'B', AD = A'D'$;
 - c) $AD = A'D', BC = B'C'$;
 - d) $AD = A'D', CD = C'D'$;
 - e) $AD = A'D', \angle D = \angle D'$;
 - f) $AB = A'B', \angle D = \angle D'$.
4. Dokazati da su dva Sakerijeva četvorougla $ABCD$ i $A'B'C'D'$ sa osnovama AB i $A'B'$ podudarna ako je:
 - a) $AB = A'B', BC = B'C'$;
 - b) $AB = A'B', CD = C'D'$;
 - c) $BC = B'C', CD = C'D'$;
 - d) $AB = A'B', \angle C = \angle C'$;
 - e) $BC = B'C', \angle C = \angle C'$;
 - f) $CD = C'D', \angle C = \angle C'$.
5. Ako su tačke P i Q središta stranica AB i AC trougla ABC , dokazati da su prave BC i PQ međusobom hiperparalelne.
6. Ako su A, B, C tri razne tačke neke prave l i O tačka izvan te prave, dokazati da središta A', B', C' duži OA, OB, OC ne pripadaju jednoj pravoj.
7. Dokazati da je u Sakerijevom četvorouglu protivosnovica veća od osnovice.
8. Ako su P i Q središta stranica AB i AC trougla ABC , dokazati da je $PQ < \frac{1}{2}BC$.
9. Neka je A_1 središte hipotenuze BC pravouglog trougla ABC . Dokazati da je duž AA_1 manja od polovine hipotenuze.
10. Ako je visina ekvidistante veća od nule tada ta ekvidistanta nije prava. Dokazati.
11. Prave p i q seku se u tački S . Odrediti pravu a paralelnu pravoj q u određenom smeru i normalnu na pravoj p .
12. Prave p i q su paralelne. Odrediti pravu a paralelnu pravoj q u određenom smeru i normalnu na pravoj p .
13. Prave p i q su hiperparalelne. Odrediti pravu a paralelnu pravoj q u određenom smeru i normalnu na pravoj p .
14. Neka su a, b i c međusobno paralelne prave, ali ne sve u istom smeru. Neka su b' i c' upravne iz tačke A prave a na pravama b i c . Odrediti ugao između pravih b' i c' .
15. Dva razna parabolička pramena imaju zajedničku pravu. Dokazati.

- 16.** Neka su A, B, C i D tačke takve da su redom poluprave AB i DC , odnosno BC i AD paralelne. Dokazati da su simetrale unutrašnjih uglova kod temena A i C i spoljašnjih uglova kod temena B i D prave istog pramena.
- 17.** Dokazati da za tri nekolinearne tačke A, B, C važi $\Pi\left(\frac{BC}{2}\right) < \frac{1}{2}(\angle ABC + \angle ACB + \angle BAC)$.
- 18.** Ako je u ravni Lobačevskog dat trougao ABC kod koga je $\angle C$ prav, tj. $\angle C = R$, zatim $\angle A = \Pi(a')$, $\angle B = \Pi(b')$, $BC = a$ i $AB = c$, dokazati da je:
- $\angle A = \Pi(b) - \Pi(c + b')$;
 - $\angle A = \begin{cases} \Pi(c - b') - \Pi(b) & \text{za } b' < c \\ 2R - \Pi(b) - \Pi(b' - c) & \text{za } b' > c \end{cases}$;
 - $\angle A = \begin{cases} \frac{1}{2}[\Pi(c - b') - \Pi(c + b')] & \text{za } b' < c \\ R - \frac{1}{2}[\Pi(b' + c) + \Pi(b' - c)] & \text{za } b' > c \end{cases}$;
 - $\Pi(b) = \begin{cases} \frac{1}{2}[\Pi(c + b') + \Pi(c - b')] & \text{za } b' < c \\ R - \frac{1}{2}[\Pi(b' + c) - \Pi(b' - c)] & \text{za } b' > c \end{cases}$;
 - $\Pi(a' - b) + \Pi(a + b') = R$, $\Pi(b' - a) + \Pi(b + a') = R$.

POENKAREOV DISK MODEL

- U Poenkareovom disk modelu hiperboličke ravni date su h -prava a i h -tačka A . Odrediti h -pravu n koja sadrži tačku A i upravna je na pravu a .
- U Poenkareovom disk modelu date su tačke A i B . Odrediti h -simetralu duži AB .
- U Poenkareovom disk modelu date su tačke X i Y . Konstruisati h -krug l sa centrom u tački X koji sadrži tačku Y .
- U Poenkareovom disk modelu date su dve prave koje se sekut. Odrediti h -bisektrisu ugla kojeg određuju.
- U Poenkareovom disk modelu konstruisati h -duž mere $\Pi^{-1}\left(\frac{R}{2}\right)$.